

経口避妊剤

シンフェーズ®T28錠を服用している方へ

- シンフェーズ®T28錠を服用すると、**血栓症(血管内に血のかたまりが詰まる病気)**を発現する可能性があります。
- 血栓症の早期発見のためにも**定期的な診察**を受けてください。
- 次のような症状があらわれた場合は、**すぐに救急医療機関を受診**してください。

- 突然の足の痛み・腫れ
- 手足の脱力・まひ
- 突然の息切れ、押しつぶされるような胸の痛み
- 激しい頭痛、舌のもつれ・しゃべりにくい
- 突然の視力障害(見えにくいところがある、視野が狭くなる) など

他の診療科、医療機関を受診する際には、このカードを必ず提示してください。

経口避妊剤

シンフェーズ[®]T28錠を服用している方へ

- 次のような症状があらわれた場合は、血栓症の疑いがあります。症状が軽くても飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

足の痛み・腫れ・しびれ・発赤・ほてり・頭痛、嘔吐(おうと)・吐き気 など

- 次のような状態になった場合、飲むのをやめて**すぐに医師に相談**してください。

体を動かさない、脱水 など

長時間同じ姿勢でいたり、水分が不足したりすると血栓症が起こりやすくなります。適度に体を動かしたり、こまめに水分をとるようにしましょう。

受診医療機関の先生方へ

- この患者さんはシンフェーズ®T28錠(卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤)を服用しています。
- 患者さんが本カードの赤枠内に記載されている症状を訴えて受診した場合には、卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤に関連した**血栓症***の可能性を念頭においた診察をお願いします。

※主に下肢静脈血栓症、肺血栓塞栓症、まれに頭蓋内静脈洞血栓症、脳梗塞、腸間膜血栓症、網膜血栓症、心筋梗塞等

- 異常な症状があれば必要に応じて処方医にご相談ください。

医療機関使用欄

シンフェーズ®T28錠服用開始日

年 月 日

シンフェーズ®T28錠に関するお問い合わせ
科研製薬株式会社「医薬品情報サービス室」

TEL:0120-519-874

受付時間:9:00~17:00

(土・日・祝日および当社休業日を除く)

2014年2月作成 TSY18-14B-160-D1

#) OC による血栓症の注意喚起カードの一覧(各OC別、製薬会社別) H26年2月

- 001 プラノバル(あすか製薬くすり相談室) = 0120-848-339
(受付時間 9:00~17:30 土日祝日を除く)
- 002 トリキュラー錠21、28(バイエル薬品 OCサポートコール) = 03-3267-4104
(受付時間 10:00~16:00 土日祝日を除く)
- 003 アンジュ21錠・28錠(あすか製薬くすり相談室) = 0120-848-339
(受付時間 9:00~17:30 土日祝日を除く)
- 004 シンフェーズT 28錠(科研製薬医薬品情報サービス室) = 0120-519-874
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
- 005 マーベロン錠(MSDカスタマーサービスセンター) = 0120-024-964
(受付時間 9:00~17:30 土日祝日を除く)
- 006 ヤーズ配合錠(バイエル薬品くすり相談室) = 0120-113-225
(受付時間 24時間対応)
- 007 ルナベル配合錠(富士製薬富山工場学術情報部) = 076-478-0032)
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
- 008 ファボワール錠21/28(富士製薬富山工場学術情報部) = 076-478-0032)
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
- 009 ラベルフィューユ21錠/28錠(富士製薬学術情報部) = 076-478-0032)
(受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
- 010 OC ヘルプデスク(一般の副作用相談)(富士製薬)
= 03-6280-8404(日本家族計画協会の相談員が対応)

#) 肺血栓症などの重症例については、広島市民病院が、治療可能(24時間救急)