



子宮内膜症と診断された患者様へ

～子宮内膜症病変のしやすい部位～


監修：百枝 幹雄 [東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科]

①





腹腔鏡挿入位置




子宮内膜症の治療

治療目的

① 痛みの緩和 ② 妊娠率の改善 ③ がん化の予防

ライフステージ
と治療薬





ルナベル®配合錠の飲み方

ルナベル®配合錠は
子宮内膜症に伴う月経困難症の治療薬です。

**ルナベル®配合錠は、
21日間飲み続けて
7日間お休みするお薬です。**

カレンダーに飲む期間や次回受診日などを
記入すると安心です。



※すべて同じ成分の
錠剤なので、どこ
から飲み始めても
安心です。

服用中に気になる症状があった場合には相談してください。

**毎日1錠、ほぼ同じ時間帯に
飲んでください。**

起床時、就寝時などいつでも、
また、食事と関係なく空腹時でも食後でも飲めます。

●万が一飲み忘れた場合は・・・

1日分(1錠)飲み忘れた場合

前々日	前日	気づいた当日		翌日
	飲み忘れ			

2日分(2錠)飲み忘れた場合

前々日	前日	気づいた当日		翌日
飲み忘れ	飲み忘れ			