

ED治療のフローチャート

監修：総合せき損センター 泌尿器科 部長 木元康介先生

治癒可能なEDであれば
治療・リスクファクターの排除・患者とパートナーの教育とカウンセリング

患者とパートナーの希望を聞き、治療法を決定

第1選択

PDE5阻害剤 または 陰圧式勃起補助具

治療効果判定・副作用チェック

効果不十分・重篤な副作用出現

第2選択

海綿体注射 (わが国において承認された治療法でないため、岡山大学の臨床試験に参加することが望ましい。)

効果不十分・重篤な副作用出現

第3選択

プロステーシス挿入手術を考慮

日本性機能学会、ED診療ガイドライン作成委員会編集：ED診療ガイドライン（第1版）, 2008より一部改変

©2009 日本性機能学会 LEV-08-0016

LEV-08-0016



**レビトラ錠を効果的に
お使いいただくために**

資料請求先
バイエル薬品株式会社
大阪市淀川区富田3-6-36 〒532-8577
<http://www.bayer.co.jp/byl>



Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharma

監修：高松赤十字病院 第二泌尿器科 部長 川西泰夫先生

CHECK 1.



性行為の約1時間前に薬を服用しましたか？

レビトラ錠は効果が現れるまでに多少時間がかかります。
服用から性交までの時間が短すぎたり長すぎたりすると、十分に効果が現れないことがあります。

CHECK 2.



性的刺激はありましたか？

レビトラ錠には性欲を高める作用はなく、服用しただけでは勃起しません。
性的な刺激を受けて初めて勃起が起こります。レビトラ錠は勃起が起こるのを助ける薬です。

CHECK 3.



お酒や食事を摂りすぎていませんか？

お酒は飲みすぎると勃起しにくくなります。
また、レビトラ錠は標準的な食事では影響を受けませんが、
食事の内容によっては効きにくくなる可能性があります。飲みすぎ食べすぎには注意しましょう。

Try again!



初めてレビトラ錠を服用する場合、不安や緊張のため十分な効果があらわれないことがあります。
あきらめないで何回か服用してみてください。

レビトラ錠は医師の指示通りに服用してください。

挿入時間どのくらいが望ましい？

7～13分》望ましい

10～30分》長すぎる

1～2分》短すぎる

**Sex Therapists調査(海外データ)によると、
望ましい挿入時間は“7～13分”であった¹⁾**

1) Corty EW, and Guardiani JM : J Sex Med 5 : 1251-1256, 2008改変

挿入時間の検討

速やかに、力強く—



勃起不全治療剤

薬価基準未収載

レビトラ錠 20mg
10mg
5mg

LEVITRA® (バルデナフィル塩酸塩水和物錠)

指定医薬品、処方せん医薬品

注意—医師の処方せんにより使用すること

■ 警告

(1) 本剤と硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等)との併用により降圧作用が増強し、過度に血圧を下降させることがあるので、本剤投与の前に、硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤が投与されていないことを十分確認し、本剤投与中及び投与後においても硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤が投与されないよう十分注意すること。(2) 心筋梗塞等の重篤な心血管系等の有害事象が報告されているので、本剤投与の前に、心血管系障害の有無等を十分確認すること。

■ 禁忌 (次の患者には投与しないこと)

(1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 (2) 硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等)を投与中の患者 (3) 心血管系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる患者 (4) 先天性のQT延長患者 (QT延長症候群)、クラスIA (キニジン、プロカインアミド等) 又はクラスIII (アミオダロン、ソタロール等) の抗不整脈薬を投与中の患者 (5) 脳梗塞・脳出血や心筋梗塞の既往歴が最近6ヵ月以内にある患者 (6) 重度の肝障害のある患者 (7) 血液透析が必要な腎障害、低血圧 (安静時収縮期血圧<90mmHg) 又は治療による管理がなされていない高血圧 (安静時収縮期血圧>170mmHg 又は安静時拡張期血圧>100mmHg)、不安定狭心症のある患者 (8) リトナビル、インジナビル、アタザナビル、サキナビル、サキナビルメシル酸塩、ホスアンブレナビル、ロピナビル・リトナビル、ダルナビルを投与中の患者 (9) ケトコナゾール、イトラコナゾールを投与中の患者 (10) 網膜色素変性症患者


「効能・効果」、「用法・用量」、「警告・禁忌を含む使用上の注意」等についてはD.I.欄及び製品添付文書をご参照ください。





挿入時間※に対するレビトラの効果

脂質異常症患者対象試験¹⁾ (海外データ)



プラセボ対照二重盲検比較試験 (米国59施設)

【対 象】 3ヵ月以上にわたり脂質異常症及び6ヵ月以上にわたりEDを有する患者395例(18~64歳)


【方 法】 被験者をランダムにレビトラ可変用量(5~20mg)もしくはプラセボに割り付け、12週間治療を行った。

1次評価項目: IIEF-EF Domain, SEP-2, SEP-3

2次評価項目: 挿入時間*

【副作用】 安全性解析対象例198例における発現率5%以上の有害事象は、頭痛17例(9%)、上気道感染症9例(5%)であった。ただし、集計法により鼻閉などの症状も上気道感染症として集計された。

ENDURANCE study²⁾ (海外データ)



プラセボ対照二重盲検クロスオーバー比較試験

【対 象】 6ヵ月以上にわたりEDを有する患者201例(18~64歳)

【方 法】 被験者をランダムにレビトラ10mgもしくはプラセボに割り付け、ウォッシュアウト期間を除き8週間治療を行った。

1次評価項目: 挿入時間*

2次評価項目: IIEF-EF Domain, SEP-2, SEP-3, 総合評価調査票(GAQ)


【副作用】 安全性解析対象例191例における発現率3%以上の有害事象は、ほてり10例(5%)、頭痛5例(3%)であった。

※挿入可能な勃起の硬さになってから、パートナーの膣から外すまでの時間をストップウォッチで測定

レビトラは唯一、ED患者に対し臨床的に
挿入時間^{*}の延長が認められたED治療薬です^{1) 2)}



レビトラは、挿入時間^{*}を2倍以上に延長します



レビトラは、“望ましい”と考えられる時間³⁾まで
挿入時間^{*}を延長できます

1) Miner M et al : J Sex Med 5 : 1455-1467, 2008.
2) Rosenberg MT et al : Int J Clin Pract 63(1) : 27-34, 2009.
3) Corty EW, and Guardiani JM : J Sex Med 5 : 1251-1256, 2008.

レビトラの「効能・効果」は、「勃起不全(満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者)」です。

勃起不全治療剤 薬価基準未収載

レビトラ錠 20mg 10mg 5mg

処方せん医薬品

注意—医師の処方せんにより使用すること

警告	(1) 本剤と硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン, 亜硝酸アミル, 硝酸イソソルビド, ニコランジル等)との併用により降圧作用が増強し, 過度に血圧を下降させることがあるので, 本剤投与の前に, 硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤が投与されていないことを十分確認し, 本剤投与中及び投与後においても硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤が投与されないよう十分注意すること。〔禁忌〕(2)の項参照
禁忌	(次の患者には投与しないこと) (1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 (2) 硝酸剤あるいは一酸化窒素(NO)供与剤(ニトログリセリン, 亜硝酸アミル, 硝酸イソソルビド, ニコランジル等)を投与中の患者〔相互作用〕(1)の項参照 (3) 心血管系障害を有する患者が不適当と考えられる患者 (4) 先天性のQT延長症患者(QT延長症候群), クラスIA(キニジン, プロカインアミド等)又はクラスIII(アモダロン, ソラロール等)の抗不整脈薬を投与中の患者〔相互作用〕(1)の項参照 (5) 肺梗塞・脳出血や心筋梗塞の既往歴が最近6ヵ月以内にある患者 (6) 重度の肝障害のある患者 (7) 血液透析が必要な腎障害, 低血圧(安静時収縮期血圧<90mmHg)又は治療による管理がなされていない高血圧(安静時収縮期血圧>170mmHg)又は安静時拡張期血圧>100mmHg, 不安定狭心症のある患者 (8) リタナビル, インジナビル, アタザナビル, サキナビル, サキナビルメシル酸塩, ホスアンブレナビル, ロピナビル・リトナビル・ダルナビルを投与中の患者〔相互作用〕(1)の項参照 (9) ケトコナゾール, イトラコナゾールを投与中の患者〔相互作用〕(1)の項参照 (10) 網膜色素変性症患者〔網膜色素変性症の患者にはホスホジエステラーゼ(PDE)の遺伝的障害を持つ症例が少数認められる。〕
効能・効果	勃起不全(満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者)
用法・用量	通常, 成人には1日1回バルデナフィルとして10mgを性行為の約1時間前に経口投与する。10mgの投与で十分な効果が得られず, 忍容性が良好と判断された器質性又は混合型勃起不全患者に対しては, 20mgに増量することができる。 高齢者(65歳以上), 中等度の肝障害のある患者については, 本剤の血漿中濃度が上昇することが認められているので, 5mgを開始用量とし, 最高用量は10mgとする。1日の投与は1回とし, 投与間隔は24時間以上とすること。

■使用上の注意■

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 陰茎の構造上欠陥(屈曲, 陰茎の線維化, Peyronie病等)のある患者〔性行為が困難であり痛みを伴う可能性がある。〕
- (2) 持続勃起症の発症となり得る疾患(鎌状赤血球性貧血, 多発性骨髄腫, 白血病等)のある患者
- (3) 他の勃起不全治療薬を投与中の患者〔他の勃起不全治療薬との併用使用の経験がない。〕
- (4) 出血性疾患又は消化性潰瘍のある患者〔ニトログリセリン(NG)供与剤の血小板凝集抑制作用を増強することが認められている。出血性疾患又は消化性潰瘍のある患者に対する安全性は確立していない。〕
- (5) チクロクロマP4503A4を阻害する薬剤(マクロリド系抗生剤)を投与中の患者〔本剤の血漿中濃度が上昇することが認められているので, 投与量は5mgを超えないこと。〕〔相互作用〕(2)の項参照
- (6) 高齢者(65歳以上)〔高齢者への投与〕の項参照
- (7) 中等度の肝障害のある患者〔本剤の血漿中濃度が上昇することが認められているので, 低用量(5mg)から投与を開始すること。慎重に投与すること。〕
- (8) α遮断薬を投与中の患者〔併用により, 症候性低血圧があらわれるおそれがある。α遮断薬による治療で患者の状態が安定していることを確認した上で, 低用量(5mg)から投与を開始するなど慎重に投与すること。〕〔相互作用〕(2)の項参照

2. 重要な基本的注意

- (1) 投与に際しては, 勃起不全及びその基礎疾患の診断のため, 既往歴の調査や諸検査を行い, 客観的な診断に基づき治療が必要とされる患者に限定すること。
- (2) 性行為は心臓へのリスクを伴うため, 勃起不全の治療を開始する前に心血管系の状態に注意を払うこと。本剤は血管拡張作用を有するため一過性の軽度の血圧低下がみられる場合がある。大動脈弁狭窄症, 閉塞性大動脈弁下狭窄症等, 左室流出路の閉塞を有する患者は本剤の血管拡張作用による影響を受ける場合がある。心血管系の状態によって性行為が望まれない患者には勃起不全治療薬の使用は行わないこと。
- (3) 臨床薬理試験において本剤投与によるQTc延長がみられていることから, 心血管系障害又は肝障害を有する患者に対しては, 本剤投与中に必要に応じて心電図検査を実施することが望ましい。
- (4) 4時間以上の勃起の延長又は持続勃起(6時間以上持続する痛みを伴う勃起)が外国臨床試験で少数報告されている。持続勃起に対する処置を速やかに行わないと陰茎組織の損傷又は勃起機能の永続的な低下があることがあり, 勃起が4時間以上持続する症状がみられた場合には直ちに医師の診断を受けるよう指導すること。
- (5) 本剤は催淫剤又は性欲増進剤ではない。
- (6) 臨床試験において, めまいや視覚障害が認められているので, 高所作業, 自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意すること。

3. 相互作用

本剤は, 主にチクロクロマP450 3A4 (CYP3A4) により代謝される。

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
硝酸剤及びNO供与剤 (ニトログリセリン, 亜硝酸アミル, 硝酸イソソルビド, ニコランジル等)	併用により, 降圧作用を増強し, 過度に血圧を下降させることがある。	NOはGMPの産生を刺激し, 一方, 本剤はcGMPの分解を抑制することから, 両剤の併用によりcGMPの増大を介するNOの降圧作用が増強する。
リタナビル ノルブア	本剤のAUCが約4倍に増加し, C _{max} が約3倍に上昇し, 半減期が約1.5倍に延長するとの報告がある。〔薬物動態〕の項参照	CYP3A4阻害によりクリアランスが減少する。
インジナビル クイニジン	本剤のAUCが約1.6倍に増加し, C _{max} が約1.7倍に上昇し, 半減期が約2倍に延長するとの報告がある。〔薬物動態〕の項参照	CYP3A4阻害によりクリアランスが減少する。
アタザナビル レイタナビル サキナビル ファートベイス サキナビルメシル酸塩 インビラゲ ホスアンブレナビル レクタン ロピナビル・リトナビル カレトラ ダルナビル プロジナ	本剤の血漿中濃度が上昇し, 半減期が延長するおそれがある。	CYP3A4阻害によりクリアランスが減少する。
ケトコナゾール 経口剤: 国内未発売 イトラコナゾール イリノール	本剤のAUCが約1.6倍に増加し, C _{max} が約4倍に上昇するとの報告がある。〔薬物動態〕の項参照	CYP3A4阻害によりクリアランスが減少する。

詳細は, 製品添付文書をご参照ください。
使用上の注意の改訂には十分ご留意ください。

資料請求先
バイエル薬品株式会社
* 大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001
http://www.bayer.co.jp/byl



Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharma

商品名	和名	レビトラ®錠5mg/レビトラ®錠10mg/レビトラ®錠20mg				
	洋名	LEVITRA® 5mg/LEVITRA® 10mg/LEVITRA® 20mg				
一般名	和名	バルデナフィル塩酸塩水和物				
	洋名	Vardenafil Hydrochloride Hydrate				
貯法	室温保存	使用期限	外箱に表示	日本標準商品分類番号	87259	
承認番号	5mg:21600AMY00075000/10mg:21600AMY00076000/20mg:21900AMX00934000					
承認年月日	5mg,10mg:2004年4月23日/20mg:2007年5月24日	薬価基準収載		未収載		
販売開始年月	5mg,10mg:2004年6月/20mg:2007年7月	国際誕生年月		2003年3月		
製造販売元	バイエル薬品株式会社					
本剤は1錠中バルデナフィルとして5mg,10mg又は20mg(バルデナフィル塩酸塩水和物として5.926mg,11.852mg又は23.705mg)を含有する淡黄色のフィルムコーティング錠である。添加剤として結晶セルロース,クロスボンドン,軽質無水ケイ酸,ステアリン酸マグネシウム,ヒプロメロース,マクロゴール400,酸化チタン,黄色二酸化鉄,三酸化鉄を含有する。						
組成・性状	販売名	レビトラ錠5mg	レビトラ錠10mg	レビトラ錠20mg		
	外形	上面				
		下面	⑤	⑩	②⑦	
		側面				
		直径(mm)	6.0	7.0	8.0	
	厚さ(mm)	2.7~3.1	3.0~3.4	3.3~3.7		
	重さ(mg)	89.8	129.0	182.6		
	有効成分に関する理化学的知見: 詳細は,製品添付文書をご参照ください。					

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
クラスIA抗不整脈薬 (キニジン, プロカインアミド等) クラスIII抗不整脈薬 (アモダロン, ソラロール等)	本剤の心臓伝導系への影響を検討する臨床薬理試験において本剤投与によるQTc延長がみられている。〔薬物動態〕の項参照	これらの薬剤はいずれもQTc延長作用がみられている。本剤を併用した場合, 相加的なQTc延長がみられるおそれがある。

(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
マクロリド系抗生剤 (エリスロマイシン等)	エリスロマイシンで本剤のAUCが約4倍に増加し, C _{max} が約3倍に上昇するとの報告がある。〔薬物動態〕の項参照	CYP3A4阻害によりクリアランスが減少する。
ピカルガミド	本剤の血漿中濃度が上昇するおそれがある。	CYP3A4阻害によりクリアランスが減少する。
CYP3A4誘導薬 (リファンピリン等)	本剤の血漿中濃度が低下するおそれがある。	代謝酵素誘導によりクリアランスが増加する。
カルベリチド	併用により, 降圧作用が増強するおそれがある。	本剤は血管拡張作用による降圧作用を有するため, 併用により降圧作用が増強するおそれがある。
α遮断薬 (テラゾリン, タムロシン等)	併用により, 症候性低血圧があらわれるおそれがある。α遮断薬による治療で患者の状態が安定していることを確認した上で, 本剤5mgから投与を開始すること。また, α遮断薬と併用する場合には, α遮断薬との投与間隔を考慮すること。〔薬物動態〕の項参照	本剤は血管拡張作用による降圧作用を有するため, 併用により降圧作用が増強する。

4. 副作用

国内データ: 国内で実施された臨床試験において, 本剤5mg, 10mg, 20mgを投与された総症例913例中257例(28.1%)に副作用が認められた。主な副作用は, ぼやけ143例(15.6%), 頭痛51例(5.59%), 鼻閉27例(2.96%), 心悸亢進27例(2.96%)等であった。
外国データ: 外国で実施された臨床試験において, 本剤5mg, 10mg, 20mgを投与された総症例7,080例中2,206例(31.16%)に副作用が認められた。主な副作用は, 頭痛871例(12.30%), ぼやけ749例(10.58%), 鼻閉313例(4.42%), 消化不良230例(3.25%)及びめまい125例(1.77%)等であった。
次のような副作用が認められた場合には, 必要に応じ, 減量, 投与中止等の適切な処置を行うこと。

頻度	副作用	1~10%未満	0.1~1%未満	0.01~0.1%未満	頻度不明*
循環器	ぼやけ	顔面浮腫, 高血圧, 心悸亢進, 胸痛, 低血圧, 起立性低血圧	狭心症, 心筋虚血, 失神	心筋梗塞**	
精神神経系	頭痛	感覚麻痺, 不眠症, 異常感覚, 頭暈, 眩暈	緊張性頭痛, 不安	一過性全健忘	
肝臓		新機軸性肝障害, γ-GTP上昇			
呼吸器	鼻閉	呼吸困難, 鼻出血, 鼻血			
筋・骨格系		背部痛, 腕痛, 筋肉痛	頸部痛		
皮膚		光線過敏性反応, 痒疹, 発疹, 発汗			
消化器	消化不良, 嘔気	腹痛, 下痢, 口内乾痛, 胃炎, 嘔吐, 食慾減, 胃食道逆流	嘔吐, 胃痛		
感覚器		視覚異常, 聴覚異常, 視力低下, 結膜充血, 眩暈, 耳鳴, 流涙	聴力障害		
その他		無力症, 熱感, 熱感, CK(CPK)上昇, 異常感	針刺傷, アナフィラキシー反応, インフルエンザウイルス感染, 肺炎, 結核, 梅毒, 淋病, 細菌性皮膚炎, 真菌性皮膚炎		

*1: 自発報告等を含むため頻度不明。

*2: 因果関係は明らかでないが, 外国において市販後, 本剤投与後に心筋梗塞が発症したことが報告されている。

5. 高齢者への投与

本剤の血漿中濃度が上昇することがあるため, 低用量(5mg)から投与を開始するなど慎重に投与すること。〔薬物動態〕の項参照

6. 妊婦・産婦・授乳婦等への投与

女性に対する適応はない。

7. 小児等への投与

小児等に対する適応はない。

8. 過量投与

(1) 症状

外国において, 健康成人男子に対する120mg単回投与では, 一過性の背部痛, 筋肉痛, 視覚異常がみられたが, 重篤な有害事象は認められなかった。40mg/1錠投与後, 高度の背部痛が認められたが, 筋肉系, 神経系の障害は認められなかった¹⁾。

(2) 処置

過量投与の際の特効的な薬物療法はないが, 適切な対応療法を行うこと。なお, 本剤は血漿蛋白結合率が低く, 尿中排泄率が低いので腎透析によるクリアランスの促進は期待できない。

9. 適用上の注意

薬剤交付時: PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。〔PTPシートの誤飲により, 硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し, 更に穿孔を起して縦隔炎等の重篤な合併症を併発すること〕が報告されている。〕

10. その他の注意

- (1) 薬剤との因果関係は明らかでないが, 外国において本剤を含むPDE5阻害薬投与中に, まれに, 視力低下や視力喪失の原因となる非動脈性前部出血性視神経症(NAION)の発症が報告されている。これらの患者の多くは, NAIONの危険因子〔年齢(50歳以上), 糖尿病, 高血圧, 冠動脈疾患, 高脂血症, 喫煙等〕を有していた。
- (2) 薬剤との因果関係は明らかでないが, 外国において本剤を含むPDE5阻害薬投与後に, まれに, 聴覚障害の発症が報告されている。
- (3) 薬剤との因果関係は明らかでないが, 外国において本剤を含むPDE5阻害薬投与後に, まれに, 急速な聴力低下又は突発性聴覚障害が報告されている。これらの患者では, 耳鳴やめまいを伴うことがある。
- (4) 本剤には性行為感染症を防ぐ効果はない。

注1: 40mg, 120mgは国内承認用量と異なる。

■包装

錠剤 5mg	PTP包装	20錠(4錠×5)
10mg	PTP包装	20錠(4錠×5), 40錠(4錠×10)
20mg	PTP包装	20錠(4錠×5), 40錠(4錠×10)

**2009年6月改訂(第10版)
**2008年8月改訂

商品名

LEV-09-0008

レビトラ[®]錠の併用禁忌又は 併用注意薬剤一覧

2008年1月作成(第6版)

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法
硝酸剤及びNO供与剤 (ニトログリセリン, 亜硝酸アミル, 硝酸イソノルビド, ニコランジル等)	併用により, 降圧作用を増強し, 過度に血圧を下降させることがある。
CYP3A4を強く阻害する薬剤 リトナビル ノービア	本剤のAUC ₀₋₂₄ が49倍に増加し, C _{max} が13倍に上昇し, 半減期が10倍に延長するとの報告がある。
インジナビル クリキシパン	本剤のAUCが16倍に増加し, C _{max} が7倍に上昇し, 半減期が2倍に延長するとの報告がある。
アタザナビル レイアタツツ サキナビル フォートベイス メシル酸サキナビル インビラーゼ ホスアンプレナビル レクシヴァ ロピナビル・リトナビル カレトラ ダルナビル ブリジスタ	本剤の血漿中濃度が上昇し, 半減期が延長するおそれがある。
ケトコナゾール 経口剤: 国内未発売 イトラコナゾール イトリゾール	本剤のAUCが10倍に増加し, C _{max} が4倍に上昇するとの報告がある。
クラスIA抗不整脈薬 (キニジン, プロカインアミド等) クラスIII抗不整脈薬 (アミオダロン, ソタロール等)	本剤の心臓伝導系への影響を検討する臨床薬理試験において本剤投与によるQTc延長がみられている。

(2) 併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法
マクロライド系抗生物質 (エリスロマイシン等)	エリスロマイシンで, 本剤のAUCが4倍に増加し, C _{max} が3倍に上昇するとの報告がある。
ビカルタミド	本剤の血漿中濃度が上昇するおそれがある。
CYP3A4誘導薬(リファンピシン等)	本剤の血漿中濃度が低下するおそれがある。
カルベリチド	併用により, 降圧作用が増強するおそれがある。
α遮断薬 (テラゾリン, タムスロシン等)	併用により, 症候性低血圧があらわれるおそれがあるため, α遮断薬による治療で患者の状態が安定していることを確認した上で, 本剤5mgから投与を開始すること。また, 併用する場合には, α遮断薬との投与間隔を考慮すること。

CONTENTS

◆索引	1 2
◆併用禁忌	
硝酸剤及び一酸化窒素(NO) 供与剤	3 4
チトクロームP450 3A4 (CYP3A4) を強く阻害する薬剤	5
クラスIA又はクラスIIIの抗不整脈薬	6



バイエル薬品株式会社

レビトラ錠の効能・効果, 用法・用量, 警告・禁忌を含む使用上の注意等につきましては, 製品添付文書をご参照ください。

◆索引

レビトラ®錠併用禁忌薬剤

	商品名	一般名	分類		商品名	一般名	分類
ア	アイスラール錠20mg	一硝酸イソソルビド	NO	●	シノビラミドカプセル100mg「タイコー」	シノビラミド	抗不整脈
	アイトロール錠10mg/20mg				シノビランカプセル		
	アイロクール錠20				ジドレンテープ	ニトログリセリン	NO
	アジマリン錠50「イセイ」	アジマリン	抗不整脈		シノベジール錠50mg/100mg	コハク酸シベンソリン	抗不整脈
	アジマリン錠「ヨウシン」			シベノール錠50mg/100mg			
	亜硝酸アミル「三共」	亜硝酸アミル	NO	シベノール注射液	ニコランジル※ ¹	NO	
	アパティアテープ	硝酸イソソルビド		シベラント錠5mg			
	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	塩酸アミオダロン	抗不整脈	●シベンソリンコハク酸塩錠50mg/100mg「サワイ」	コハク酸シベンソリン	抗不整脈	
	●アミオダロン塩酸塩錠100mg「サント」			●シベンソリンコハク酸塩錠50mg/100mg「タナベ」			
	アミサリン錠125mg/250mg	塩酸プロカインアミド		硝酸イソソルビド錠(ツルハラ)	硝酸イソソルビド	NO	
	アミサリン注						
	アンカロン錠100	塩酸アミオダロン	シルビノール錠5mg	ニコランジル※ ¹	抗不整脈		
	●アンカロン注150		シンビット静注用50mg	塩酸ニフェカラン			
	アンタップR	硝酸イソソルビド	NO	ステンベルガー錠5mg	ニコランジル※ ¹	NO	
	イコナゾンカプセル50	イトラコナゾール	CYP	ソタコール錠40mg/80mg	塩酸ソタロール	抗不整脈	
	イソコロナールRカプセル	硝酸イソソルビド	NO	ソビラート「カプセル」/カプセル100mg	シノビラミド		
	イソニート錠20	一硝酸イソソルビド		ソブレロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	NO	
	イソビット	硝酸イソソルビド		タイシロール錠20mg	一硝酸イソソルビド	NO	
	イソモニット錠20mg	一硝酸イソソルビド		タイリンダーR錠	リン酸シノビラミド	抗不整脈	
	イデノラートカプセル50mg	イトラコナゾール	タイリンダーカプセル	シノビラミド			
	イトラートカプセル50		チヨバンカプセル50mg/100mg	イトラコナゾール	CYP		
	イトラコナゾール錠50/100「MEEK」		トラコナ錠50mg/100mg				
	イトラコネート錠50mg/100mg		ニコランジス錠2.5mg/5mg	ニコランジル※ ¹	NO		
	イトラコンカプセル50		●ニコランジル点滴静注用2mg/12mg/48mg「サワイ」				
	イトラリール錠50/100		ニコランタ錠5				
	イトリゾールカプセル50		ニコランマート錠/5mg	ニトロブシドナトリウム			
	イトリゾール注1%		●ニトロブシド持続静注液6mg/30mg	ニトロ注			
イトリゾール内用液1%	メシル酸サキナビル		ニトラステープ	硝酸イソソルビド			
インビラゼカプセル200mg	ニコランジル※ ¹	ニトルピン錠5	ニコランジル※ ¹				
インビラゼ錠500mg	硝酸イソソルビド	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド				
エスタット錠5mg	NO	●ニトロール持続静注25mgシリンジ		NO			
L-オーネスゲン錠		ニトロール錠/5mg					
カ	カリアントSRカプセル20mg	硝酸イソソルビド				NO	ニトロールスプレー
	カレトラ錠	ロピナビル・リトナビル				CYP	ニトロール注5mg/50mg/100mg
	カレトラ・ソフトカプセル		●ニトロール注5mgシリンジ				
	カレトラ・リキッド		ニトロール注バッグ50mg/100mg				
	冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	ニトログリセリン	NO	ニトログリセリン錠山ノ川			
	クリキシバンカプセル/200mg	硫酸インジナビルエタノール付加物	CYP	ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」			
	コバインター錠5mg	ニコランジル※ ¹	NO	ニトログリセリン注25mg/50mg「HK」			
コンスピット錠	硝酸イソソルビド	ニトロダームTTS					
サ	サークレス注0.05%/0.1%	硝酸イソソルビド	NO	ニトロバイド錠5mg	硝酸イソソルビド		
	サワドールL錠			ニトロベン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン		
	サワドールテープ40mg			ノーピア・ソフトカプセル100mg	リトナビル	CYP	
	ジアセラL錠/20mg			ノーピア・リキッド			
	シグマート錠2.5mg/5mg	ニコランジル※ ¹	抗不整脈				
	シグマート注2mg/12mg/48mg						
	シグランコート錠2.5mg/5mg						
	シノビラR錠			リン酸シノビラミド			

レビトラ®錠併用注意薬剤

	商品名	一般名	分類
	ノルベース50mg/100mg	ジソピラミド	抗不整脈
	ノルベースCR錠	リン酸ジソピラミド	
ハ	ハイバジールコーワ錠3/6	ニブラジロール※2	NO
	バンレーター注5mg/50mg	ニトログリセリン	
	バンレーターテープ27mg		
	バンレーター軟膏		
	バンリール錠20mg	一硝酸イソソルビド	
	ビメノールカプセル50mg/100mg	塩酸ビルメノール	抗不整脈
	ファンミルR錠	リン酸ジソピラミド	
	ファンミルカプセル	ジソピラミド	
	フォートベイスカプセル	サキナビル	CYP
	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド	NO
フランドルテープ40mg			
●プリジスタ錠300mg	ダルナビルエタノール付加物	CYP	
	ヘルビニン-Rカプセル	硝酸イソソルビド	NO
マ	ミオコールスプレー/0.3mg	ニトログリセリン	NO
	ミオコール注5mg/50mg		
	ミニトロテープ27mg		
	ミリステープ5mg		
	ミリスロール注1mg/2mL		
	ミリスロール注5mg/10mL		
	ミリスロール注25mg/50mL		
	ミリスロール注50mg/100mL		
	メデイトランテープ27mg		
ラ	リスピンカプセル100mg	ジソピラミド	抗不整脈
	リスピンR錠150mg	リン酸ジソピラミド	
	リスモダンR錠150mg		
	リスモダンカプセル50mg/100mg	ジソピラミド	
	リスモダンP静注50mg	リン酸ジソピラミド	
	リスラミドR錠150mg		
	リゾラミドR錠		
	リゾラミドカプセル	ジソピラミド	
	リファタックL錠	硝酸イソソルビド	NO
	リファタックテープ40mg		
	硫酸キニジン錠	硫酸キニジン	抗不整脈
	硫酸キニジン錠100mg「メルク」		
	硫酸キニジン「ホエイ」		
	レイアタツツカプセル150mg/200mg	硫酸アタザナビル	CYP
	レクシヴァ錠700	ホスアンブレナビル カルシウム水和物	

※1 生体内でNOとなり、硝酸剤と同様の作用を示すことが認められている。

※2 β遮断薬であるが、NO供与体様作用が報告されている。

■ 分類表記について

NO : 硝酸剤及びNO供与剤

CYP : CYP3A4を強く阻害する薬剤

抗不整脈 : クラスIA又はクラスIIIの抗不整脈薬

薬剤名 (主な商品名)
マクロライド系抗生物質 (エリスロマイシン等)
ピカルタミド (カソデックス錠80mg : アストラゼネカ)
CYP3A4誘導薬 (リファンピシン等)
カルペリチド (ハンブ注射用1000 : アスピオ-第一三共)
α遮断薬 (テラゾシン, タムスロシン等)

◆併用禁忌〈硝酸剤及び一酸化窒素(NO) 供与剤〉併用により、降圧作用を増強することがあります。

〔経口剤、外用剤〕

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
アイスラール錠20mg	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	大洋=日本ジェネリック	IN 20/* 290 [20mg] : (20mg)
アイトール錠10mg	錠 剤(10mg1錠)	一硝酸イソソルビド	トーアエイヨー=アステラス	121/* 121 : (10mg)
アイトール錠20mg	錠 剤(20mg1錠)			122/* 122 : (20mg)
アイロクール錠20	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	メディサ=沢井	SW 551/*SW-551 20mg : 20mg
亜硝酸アミル「三共」	吸入剤(0.25mL1管)	亜硝酸アミル	第一三共	—
アパティアテープ	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	帝國製薬=テイコク	☆TF-AP
アンタップR	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	帝人ファーマ	*TJN-072
イソコロナールRカプセル	徐放カプセル(20mg1カプセル)	硝酸イソソルビド	佐藤薬品=共和薬品=テイコク=日医工	☆St107
イソニートール錠20	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	東和薬品	Tw130/*Tw130 [20mg] : [20mg]
イソビット	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	東光=ラクール=バイエル薬品	* 501
イソモニット錠20mg	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	サンド	IS IS/*ISM20 [20] : 20mg
エスタット錠5mg	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	辰巳	Tu ES/*Tu ES-05 : Tu ES-05 5mg
レオーネスゲン錠	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	鶴原	TSU118/*TSU118 [20mg] : [20mg]
カリアントSRカプセル20mg	徐放カプセル(20mg1カプセル)	硝酸イソソルビド	全星=メルク製薬	KATP/*KASR : 20mg
コバインター錠5mg	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	小林化工=全星	K N : 293/*KN293 [5mg]
コンスピット錠	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	大洋	PO/* 226 [20mg] : 20mg
サウドールL錠	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	沢井	SW 920/*SW-920 [20] : 20mg
サウドールテープ40mg	貼付剤(40mg1枚)			*SW-922
ジアセラL錠	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	東和薬品	Tw D.L/*Tw.D.L [20mg] : [20mg]
●ジアセラL錠20mg	徐放錠(20mg1錠)			Tw D.L [20mg] : [20mg]
シグマート錠2.5mg	錠 剤(2.5mg1錠)	ニコランジル※1	中外	C-21F/*C-21F : [2.5]
シグマート錠5mg	錠 剤(5mg1錠)			C-21F 5/*C-21F-5 : [5]
シグランコート錠2.5mg	錠 剤(2.5mg1錠)	ニコランジル※1	長生堂	ch 31/*ch-CIG
シグランコート錠5mg	錠 剤(5mg1錠)			ch 32/*ch-CIT
ジドレンテープ	貼付剤[(27mg)9.6cm ² 1枚]	ニトログリセリン	東和薬品=田辺三菱=吉富薬品	—
シベラント錠5mg	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	大正薬品=三和化学	241/*TYK241 SIB5 : 5mg/ *TYK241 : TYK241 5mg
硝酸イソソルビド錠(ツルハラ)	錠 剤(10mg1錠)	硝酸イソソルビド	鶴原	TSU268/*TSU268 [10mg] : [10mg]
硝酸イソソルビドテープ「EMEC」	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	救急=エルメッドエーザイ	*EE301
シルビノール錠5mg	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	日新 : 山形	NS 298/*NS298
ステンベルガー錠5mg	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	陽進堂	YD 070/*YD070 : 5mg
ソプレロール錠20mg	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	日新 : 山形=日本化薬	NS 264/*NS264
タイシロール錠20mg	錠 剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	大正薬品	354/*TYK354 20mg
ニコランジス錠2.5mg	錠 剤(2.5mg1錠)	ニコランジル※1	小林薬学	KK 331/* 521
ニコランジス錠5mg	錠 剤(5mg1錠)		日医工	n 523/* 523
ニコランタ錠5	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	メディサ=沢井	SW 722/*SW-722 [5] : 5mg
ニコランマート錠	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	東和薬品=ケミファ=田辺三菱=吉富薬品	Tw : 117/*Tw117 [5mg] : [5mg] / *Y-NIK5 : Tw117 5mg
●ニコランマート錠5mg	錠 剤(5mg1錠)			Tw117 [5mg] : [5mg] / *Y-NIK5 : Tw117 5mg
ニトラステープ	貼付剤(40mg1枚)	硝酸イソソルビド	大協=全星=高田	*NTP
ニトルピン錠5	錠 剤(5mg1錠)	ニコランジル※1	大洋=日本ジェネリック	N 5/* 218 : [5mg]
ニトロールRカプセル20mg	徐放カプセル(20mg1カプセル)	硝酸イソソルビド	エーザイ	NR20/*20mg NR20
ニトロール錠	錠 剤(5mg1錠)			NR5/*5mg NR5
●ニトロール錠5mg	錠 剤(5mg1錠)			NR5/*5mg NR5
ニトロールスプレー	噴霧剤(163.5mg10g1瓶)			—
ニトログリセリン錠山川	錠 剤(0.3mg1錠)	ニトログリセリン	日本化薬	*NK2011
ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」	錠 剤(0.3mg1錠)			*NK2011
ニトログラムTTS	貼付剤[(25mg)10cm ² 1枚]	ニトログリセリン	ノバルティス	CG D0D
ニトロバイド錠5mg	錠 剤(5mg1錠)	硝酸イソソルビド	小林化工	KN 248/*KN248 [5mg]
ニトロベン舌下錠0.3mg	錠 剤(0.3mg1錠)	ニトログリセリン	日本化薬	*NK2015

注) 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社(複数社のケースも含む)は販売会社であることを示す。

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
ハイバジールコーワ錠3	錠剤(3mg1錠)	ニブラジロール ^{※2}	興和=興和創薬	<i>Kowa</i> : 530 / * <i>Kowa</i> 530 3mg : 3mg
ハイバジールコーワ錠6	錠剤(6mg1錠)			<i>Kowa</i> : 531 / * <i>Kowa</i> 531 6mg : 6mg
バンレーターテープ27mg	貼付剤[(27mg)14cm ² 1枚]	ニトログリセリン	三和化学	*Sc251
バンレーター軟膏	軟膏剤(2%1g)			—
バンリール錠20mg	錠剤(20mg1錠)	一硝酸イソソルビド	陽進堂	YD 533 / * YD533 : 20mg
フランドル錠20mg	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	トーアエイヨー=アステラス	<i>TA</i> 611 / * <i>TA</i> 611 : (20mg)
フランドルテープ40mg	貼付剤(40mg1枚)			* <i>TA</i> 613
ヘルビニン-Rカプセル	徐放カプセル(20mg1カプセル)	硝酸イソソルビド	オルガノン	BC 2 : ORGANON / * BC2 : 20mg
ミオコルスプレー0.3mg	噴霧剤(0.65%7.2g1缶)	ニトログリセリン	トーアエイヨー=アステラス	* <i>TA</i> 721
ミニトロテープ27mg	貼付剤[(27mg)14cm ² 1枚]	ニトログリセリン	日清キョーリン=杏林	* <i>nk</i> 008
ミリステープ5mg	貼付剤[(5mg)4.05cm×4.50cm1枚]	ニトログリセリン	日本化薬	* <i>SK</i> NK2013
メディトランステープ27mg	貼付剤[(27mg)14cm ² 1枚]	ニトログリセリン	積水=協和発酵	*KH212
リファタックL錠	徐放錠(20mg1錠)	硝酸イソソルビド	メディサ=明治製薬	MS R03 / * <i>MS</i> R-03 : R-03 20mg
リファタックテープ40mg	貼付剤(40mg1枚)		メディサ=持田	*MED-039

[注射剤]

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名
冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	注射剤(0.5mg10mL1管)	ニトログリセリン	日本化薬
サークルス注0.05%	注射剤(0.05%10mL1管, 0.05%100mL1瓶)	硝酸イソソルビド	高田=塩野義
サークルス注0.1%	注射剤(0.1%5mL1管, 0.1%50mL1瓶, 0.1%100mL1瓶)		
シグマート注2mg	注射剤(2mg1瓶)	ニコランジル ^{※1}	中外
シグマート注12mg	注射剤(12mg1瓶)		
シグマート注48mg	注射剤(48mg1瓶)		
●ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	注射剤(2mg1瓶)	ニコランジル ^{※1}	沢井
●ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	注射剤(12mg1瓶)		
●ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	注射剤(48mg1瓶)		
●ニトロ持続静注液6mg	注射剤(6mg2mL1管)	ニトロブシドナトリウム	丸石
●ニトロ持続静注液30mg	注射剤(30mg10mL1管)		
ニトロ注	注射剤(6mg2mL1管, 30mg10mL1管)	硝酸イソソルビド	エーザイ
●ニトロール持続静注25mgシリンジ	キット(25mg50mL1筒)		
ニトロール注5mg	注射剤(0.05%10mL1管)		
●ニトロール注5mgシリンジ	キット(5mg10mL1筒)		
ニトロール注50mg	注射剤(0.1%50mL1瓶)		
ニトロール注100mg	注射剤(0.1%100mL1瓶)		
ニトロール注バッグ50mg	注射剤(0.05%100mL1袋)		
ニトロール注バッグ100mg	注射剤(0.05%200mL1袋)		
ニトログリセリン注25mg「HK」	注射剤(25mg50mL1瓶)	ニトログリセリン	光
ニトログリセリン注50mg「HK」	注射剤(50mg100mL1瓶)		
バンレーター注5mg	注射剤(5mg10mL1管)	ニトログリセリン	三和化学
バンレーター注50mg	注射剤(50mg100mL1瓶)		
ミオコル注5mg	注射剤(5mg10mL1管)	ニトログリセリン	トーアエイヨー=アステラス
ミオコル注50mg	注射剤(50mg100mL1袋)		
ミリスロール注	注射剤(1mg2mL1管, 5mg10mL1管, 25mg50mL1瓶, 50mg100mL1瓶)	ニトログリセリン	日本化薬

^{※1} 生体内でNOとなり、硝酸剤と同様の作用を示すことが認められている。

^{※2} β遮断薬であるが、NO供与体様作用が報告されている。

□：診療報酬点数表における後発医薬品

■：上記以外の医薬品

■ 識別コード表記について 無印=本体コード *印=包装コード ☆印=本体コードと包装コードが同一のもの。：印=表：裏又は裏：表の位置関係にあることを示す。

●詳細は各製品の添付文書等をご参照ください。

◆併用禁忌〈チクローム P450 3A4 (CYP3A4) を強く阻害する薬剤〉併用により、レボトラ錠の血中濃度が上昇し、半減期が延長するとの報告があります。

〔経口剤〕

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
イコナゾンカプセル50	カプセル(50mg1カプセル)	イトラコナゾール	タチ=キ=ラ=マ=テ=イ=カ=モ=キ=レ=リ=ク	t443/〃 443
イデノラートカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	イトラコナゾール	長生堂=メルク製薬	dh-ID/〃 dh-ID 50mg
イトラートカプセル50	カプセル(50mg1カプセル)	イトラコナゾール	沢井=ケミファ	SW-881/〃SW-881: 50mg
イトラコナゾール錠50[MEEK]	錠 剤(50mg1錠)	イトラコナゾール	小林化工=明治製薬	MK 12/〃MK12 50mg: 50mg
イトラコナゾール錠100[MEEK]	錠 剤(100mg1錠)			MK 13/〃MK13 100mg: 100mg
イトラコネート錠50mg	錠 剤(50mg1錠)	イトラコナゾール	高田	TTS 655/〃TTS-655 50mg: 50mg
イトラコンカプセル50	カプセル(50mg1カプセル)	イトラコナゾール	日医工	〇146/〃〇146 50: 50mg
●イトラコネート錠100mg	錠 剤(100mg1錠)	イトラコナゾール	高田	TTS656/〃TTS-656 100mg: 100mg
イトラリール錠50	錠 剤(50mg1錠)	イトラコナゾール	全量=沢井	ZE 110/〃IT50 ZE110: 〇50mg
イトラリール錠100	錠 剤(100mg1錠)			ZE 111/〃IT100 ZE111: 〇100mg
イトリゾールカプセル50	カプセル(50mg1カプセル)	イトラコナゾール	ヤンセン	JK901/〃JK901 50mg
イトリゾール内用液1%	液 剤(1%1mL)			-
インビラーゼカプセル200mg	カプセル(200mg1カプセル)	メシル酸サキナビル	中外	ROCHE 0245
インビラーゼ錠500mg	錠 剤(500mg1錠)			ROCHE: SQV500
カレトラ錠	錠 剤(1錠)	ロビナビル・リトナビル	アボット	〇KA
カレトラ・ソフトカプセル	カプセル(1カプセル)			〇PK
カレトラ・リキッド	液 剤(1mL)			-
クリキシバンカプセル	カプセル(200mg1カプセル)	硫酸インジナビルエタノール付加物	万有	CRIXIVAN™: 200mg
●クリキシバンカプセル200mg	カプセル(200mg1カプセル)			CRIXIVAN™: 200mg
トラコナ錠50mg	錠 剤(50mg1錠)	イトラコナゾール	マルコ=日医工	〇62E/〃〇62E 50: 〇62E 50mg
トラコナ錠100mg	錠 剤(100mg1錠)			〇62H/〃〇538 100mg: 100mg
ノービア・ソフトカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)	リトナビル	アボット	〇DS 100
ノービア・リキッド	液 剤(80mg1mL)			-
フォートベイスカプセル	カプセル(200mg1カプセル)	サキナビル	中外	ROCHE 0246
●ブリジスタ錠300mg	錠 剤(300mg1錠)	ダルナビルエタノール付加物	ヤンセン	TMC114: 300MG
レイアタツカプセル150mg	カプセル(150mg1カプセル)	硫酸アタザナビル	プリストル・マイヤーズ	BMS 150mg: 3624
レイアタツカプセル200mg	カプセル(200mg1カプセル)			BMS 200mg: 3631
レクシヴァ錠700	錠 剤(700mg1錠)	ホスアンプレナビルカルシウム水和物	GSK	GXLL7
経口剤: 国内未発売	-	ケトコナゾール	-	-

〔注射剤〕

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
イトリゾール注1%	注射剤(1%20mL1管)	イトラコナゾール	ヤンセン	-

◆併用禁忌〈クラスIA又はクラスIIIの抗不整脈薬〉 併用により、心電図異常(QTc延長作用)がみられるおそれがあります。

[経口剤]

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名	識別コード
アジマリン錠50「イセイ」	錠剤(50mg1錠)	アジマリン	イセイ	*IC-404
アジマリン錠「ヨウシン」	錠剤(50mg1錠)	アジマリン	陽進堂	*YD049:
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠剤(100mg1錠)	塩酸アミオダロン	メディサ・沢井=日本ジェネリック	SW-ADN/*SW-ADN: 100mg
●アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」	錠剤(100mg1錠)	塩酸アミオダロン	サンド	*AMD100
アミサリン錠125mg	錠剤(125mg1錠)	塩酸プロカインアミド	第一三共	301/* AL 125: 301 125
アミサリン錠250mg	錠剤(250mg1錠)	塩酸プロカインアミド	第一三共	302/* AL 250: 302 250
アンカロン錠100	錠剤(100mg1錠)	塩酸アミオダロン	サノフィ・アベンティス	100/* 100 100mg: T84 100mg
ジソピラミド錠	徐放錠(150mg1錠)	リン酸ジソピラミド	ダイト=日医工	DK 323/* 278: 150
●ジソピラミドカプセル100mg「タイヨー」	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	大洋	TLD 100mg: TLD 100mg/* TLD 100mg
ジソピランカプセル	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	鶴原	*TSU277 100mg: 100mg
シノベジール錠50mg	錠剤(50mg1錠)	コハク酸シベンゾリン	東和薬品	Tw 012/*Tw 012 50mg: 50mg
シノベジール錠100mg	錠剤(100mg1錠)	コハク酸シベンゾリン	東和薬品	Tw 011/*Tw 011 100mg: 100mg
シベノール錠50mg	錠剤(50mg1錠)	コハク酸シベンゾリン	アステラス・トーア・エイヨー	302/* 302: 302 50mg
シベノール錠100mg	錠剤(100mg1錠)	コハク酸シベンゾリン	アステラス・トーア・エイヨー	312/* 312: 312 100mg
●シベンランコハク酸塩錠50mg「サワイ」	錠剤(50mg1錠)	コハク酸シベンゾリン	沢井	SWCZ 50/*SW-CZ 50
●シベンランコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠剤(100mg1錠)	コハク酸シベンゾリン	沢井	SWCZ 100/*SW-CZ 100
●シベンランコハク酸塩錠50mg「タナベ」	錠剤(50mg1錠)	コハク酸シベンゾリン	田辺三菱	TG135/*TG135
●シベンランコハク酸塩錠100mg「タナベ」	錠剤(100mg1錠)	コハク酸シベンゾリン	田辺三菱	TG136/*TG136 100
ソタコール錠40mg	錠剤(40mg1錠)	塩酸ソタロール	プリストル・マイヤーズ	BMS 622/*BMS622 40
ソタコール錠80mg	錠剤(80mg1錠)	塩酸ソタロール	プリストル・マイヤーズ	BMS 621/*BMS621 80
ソビラート「カプセル」	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	ニプロファーマ	*HD-142
●ソビラートカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	ニプロファーマ	HD142: HD142/*HD-142 100mg: 100mg
タイリンドー錠	徐放錠(150mg1錠)	リン酸ジソピラミド	大洋	t 265/* 265 150mg: 150mg
タイリンドーカプセル	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	大洋	TLD 100mg/* 288 100mg: 100mg
チヨパンカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	ジソピラミド	辰巳	Tu CB-050/*Tu CB-050: Tu CB-050 50mg
チヨパンカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	辰巳=日本ジェネリック	Tu CB-100/*Tu CB-100: Tu CB-100 100mg
ノルベース50mg	カプセル(50mg1カプセル)	ジソピラミド	ファイザー	☆SEARLE 507: 50mg
ノルベース100mg	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	ファイザー	☆SEARLE 508: 100mg
ノルベースCR錠	徐放錠(150mg1錠)	リン酸ジソピラミド	ファイザー	SEARLE 509: CR/*SEARLE 509: 193.5mg
ビメノールカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	塩酸ビルメノール	大日本住友	50: 695/* 695 50mg: 50mg
ビメノールカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)	塩酸ビルメノール	大日本住友	100: 696/* 696 100mg: 100mg
ファンミル錠	徐放錠(150mg1錠)	リン酸ジソピラミド	東和薬品	Tw: 252/*Tw 252 150mg: 150mg
ファンミルカプセル	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	東和薬品	Tw. FAN/*Tw.FAN 100mg: 100mg
リスピンカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	沢井=ケミファ	☆SW-690
リスピン錠150mg	徐放錠(150mg1錠)	リン酸ジソピラミド	沢井=ケミファ	SW 503/*SW-503/*SW-503 150: 150mg
リスモダン錠150mg	徐放錠(150mg1錠)	リン酸ジソピラミド	サノフィ・アベンティス=中外	RU: 013 J/*RU/013J: 150
リスモダンカプセル50mg	カプセル(50mg1カプセル)	ジソピラミド	サノフィ・アベンティス=中外	RURH/*RURH: 50
リスモダンカプセル100mg	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	サノフィ・アベンティス=中外	RURY/*RURY: 100
リスラミド錠150mg	徐放錠(150mg1錠)	リン酸ジソピラミド	大正薬品	242/*TYK242: TYK242 150
リゾラミド錠	徐放錠(150mg1錠)	リン酸ジソピラミド	CHO=長生堂	20/* 102
リゾラミドカプセル	カプセル(100mg1カプセル)	ジソピラミド	CHO=長生堂	*CHO-102 100mg
硫酸キニジン錠	錠剤(100mg1錠)	硫酸キニジン	興和=興和創薬	* 600 100mg: 100mg
硫酸キニジン錠100mg「メルク」	錠剤(100mg1錠)	硫酸キニジン	メルク製薬	h 757/*h-757: 100mg
硫酸キニジン「ホエイ」	散剤(1g1包)	硫酸キニジン	メルク製薬	-

[注射剤]

商品名	剤型(規格・単位)	一般名	会社名
アミサリン注	注射剤(10%1mL管、10%2mL1管)	塩酸プロカインアミド	第一三共
●アンカロン注150	注射剤(150mg3mL1管)	塩酸アミオダロン	サノフィ・アベンティス
シベノール注射液	注射剤(70mg5mL1管)	コハク酸シベンゾリン	アステラス・トーア・エイヨー
シンビット静注50mg	注射剤(50mg1瓶)	塩酸ニフェカラン	バイエル薬品
リスモダンP静注50mg	注射剤(50mg5mL1管)	リン酸ジソピラミド	サノフィ・アベンティス=中外

□: 診療報酬点数表における後発医薬品

□: 上記以外の医薬品

注) 会社名中、2社以上の表記については、前社が製造販売承認取得会社、後社(複数社のケースも含む)は販売会社であることを示す。

■ 識別コード表記について 無印=本体コード *印=包装コード ☆印=本体コードと包装コードが同一のもの。:印=表:裏又は裏:表の位置関係にあることを示す。

●詳細は各製品の添付文書等をご参照ください。

レビトラ[®]錠の 正しい使い方について



この冊子にはレビトラ[®]錠に関する大切な注意事項が
書いてあります。服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

レビトラ[®]錠は、「満足な性行為を行うに十分な勃起を
発現できない、あるいは維持ができない男性患者の勃
起不全」の治療薬です。

監修：東邦大学医学部泌尿器科学講座 教授
石井 延久 先生

INDEX

レビトラ [®] 錠は1日1回、24時間以上あけて 服用ください。	01
心臓の病気で、硝酸剤の治療を受けている 方は服用しないでください。	02
もし、レビトラ [®] 錠服用後に狭心症の発作が 起きた時は。	03
レビトラ [®] 錠を服用できない方。	04
次に当てはまる方は、必ず医師にご相談 ください。	05
レビトラ [®] 錠を服用した後に、気を付けて いただきたいこと。	06
その他に気を付けていただきたいこと。	06
〔参考〕併用禁忌薬の一覧	07
レビトラ [®] 錠を効果的にお使いいただくために	17



**レビトラ[®]錠 は1日1回、
24時間以上あけて服用ください。**

**レビトラ[®]錠は性行為の約1時間前に服用してください。
用量については、医師にご相談ください。**

**レビトラ[®]錠には5mg, 10mg, 20mg の3種類の錠剤が
あり、1回に服用できる量は医師に指示された用量まで
です。**

(原寸大)



**レビトラ[®]錠
5mg**



**レビトラ[®]錠
10mg**



**レビトラ[®]錠
20mg**

**特に高齢の方や肝臓の悪い方は、医師の指示を守って
服用してください。**



**指示された用量で効果が得られない、
あるいは副作用のため服用できない場合には、
医師又は薬剤師にご相談ください。**



心臓の病気で、硝酸剤の治療を受けている方は服用しないでください。

心臓病の薬としてよく用いられるニトログリセリンなどの硝酸剤*を使用中の方は**レビトラ[®]錠**を決して服用しないでください。

急激に血圧が下降し、場合によっては死に至るおそれがあります。

硝酸剤には飲み薬だけではなく、舌下錠、貼り薬、吸入薬、注射、塗り薬、スプレーなどもあります。

あなたがお使いのお薬に硝酸剤が含まれていないかどうか確認するために、医師又は薬剤師に必ずご相談ください。

* 詳しいお薬の名前は **07** をご覧ください。



性行為は心臓に負担をかけます。
無理をしないようにしましょう。



もし、レビトラ[®]錠 服用後に 狭心症の発作が起きた時は、

狭心症の発作が起きた場合は、その場で安静にし、直ちにかかりつけ医に連絡してください。

発作の治療にあたる医師には必ず **レビトラ[®]錠** を「服用している」と、「服用した時刻」を伝える必要があります。

今までに狭心症と診断されたことがない方でも、性行為中に狭心症の発作を起こす場合があります。

一般に、狭心症などの発作の治療には硝酸剤がよく使われますが、**レビトラ[®]錠** を服用している場合は、血圧を下げる働きが増強し、急激な血圧の下降を起こすおそれがあります。

発作の治療に硝酸剤が使えない場合、他の治療薬を使用しなければならないため、硝酸剤と同じ効果が得られないことがあります。



発作時にはご自身でそのことを伝えることができない場合が十分考えられます。あらかじめパートナーあるいはご家族の方に**レビトラ[®]錠** を服用していることを伝えておき、「**レビトラ[®]錠** を服用していること」が医師に必ず伝わるようにしてください。



レビトラ[®]錠を服用できない方.

レビトラ[®]錠を服用して過敏症（アレルギー）を起こしたことのある方

心血管系障害などにより医師から性行為が不相当だと診断された方

先天的に不整脈がある方、現在、抗不整脈薬*を使用中的の方

最近6ヵ月以内に脳梗塞・脳出血や心筋梗塞を起こしたことのある方

重い肝障害のある方

血液透析が必要な腎障害のある方

低血圧や高血圧の方
(最大血圧<90mmHg, 最大血圧>170mmHg又は最小血圧>100mmHg)

不安定狭心症のある方

抗ウイルス薬* (HIV治療薬), 抗真菌薬* (外用除く) を使用中の方

網膜色素変性症 (進行性の夜盲) の方

* 詳しいお薬の名前は 08 をご覧ください。





次に当てはまる方は、
必ず医師にご相談ください。

肝臓の病気

血液の病気（鎌状赤血球性貧血，多発性骨髄腫，白血病）

血が止まりにくい病気

胃・十二指腸潰瘍

陰茎に病気または奇形のある方

他の勃起不全治療薬・勃起補助器具を使用している方や
手術を受けたことのある方



レビトラ[®]錠と α 遮断薬（排尿障害や高血圧の治療薬）とを一緒に服用することで、「めまい」「立ちくらみ」などが起こるおそれがあります。

高所での作業，自動車の運転など危険を伴う機械を操作する時は十分ご注意ください。



**レビトラ[®]錠を服用した後に、
気を付けていただきたいこと。**

「顔がほてる」「頭痛」「消化不良」「はきけ」「鼻づまり」「動悸」「物が青く見えたり、まぶしく見える」などの副作用があらわれることがあります。

なお、勃起の持続によって陰茎が損傷し、勃起機能を永続的に失うことがありますので、**レビトラ[®]錠**服用後、4時間以上勃起が持続する場合は、すぐに医師の診察を受けてください。



**その他に
気を付けていただきたいこと。**

レビトラ[®]錠には性行為感染症を防ぐ効果はありません。

レビトラ[®]錠は催淫剤や性欲増進剤ではありません。

レビトラ[®]錠を他の人に譲らないでください。



次のお薬を使用されている方は**レビトラ[®]**錠を服用しないで

■ 硝酸剤の商品名一覧

アイスラール錠20mg	ニトロロ持続静注液6mg/30mg
アイトロール錠10mg/20mg	ニトロロ注
アイロクール錠20	ニトラステープ
亜硝酸アミル「三共」	ニトルビン錠5
アパティアテープ	ニトロールRカプセル20mg
アンタップR	ニトロール持続静注25mgシリンジ
イソコロナールRカプセル	ニトロール錠/5mg
イソニトール錠20	ニトロールスプレー
イソビット	ニトロール注5mg/50mg/100mg
イソモニット錠20mg	ニトロール注5mgシリンジ
エスタット錠5mg	ニトロール注バッグ50mg/100mg
L-オーネスゲン錠	ニログリセリン錠山川
カリアントSRカプセル20mg	ニログリセリン舌下錠0.3mg「NK」
冠動注用ミリスロール0.5mg/10mL	ニログリセリン注25mg/50mg「HK」
コバインター錠5mg	ニトロダームTTS
コンスピット錠	ニトロバイド錠5mg
サークレス注0.05%/0.1%	ニトロペン舌下錠0.3mg
サワドルL錠	ハイパジールコーワ錠3/6
サワドルテープ40mg	バンソレーター注5mg/50mg
ジアセラL錠/L錠20mg	バンソレーターテープ27mg
シグマート錠2.5mg/5mg	バンソレーター軟膏
シグマート注2mg/12mg/48mg	バンリール錠20mg
シグランコート錠2.5mg/5mg	フランドル錠20mg
ジドレンテープ	フランドルテープ40mg
シベラント錠5mg	ヘルピニン-Rカプセル
硝酸イソソルビド錠(ツルハラ)	ミオコールスプレー0.3mg
硝酸イソソルビドテープ「EMEC」	ミオコール注5mg/50mg
シルビノール錠5mg	ミニトロテープ27mg
ステンベルガー錠5mg	ミリステープ5mg
ソプレロール錠20mg	ミリスロール注
タイシロール錠20mg	メディトランステープ27mg
ニコランジス錠2.5mg/5mg	リファタックL錠
ニコランタ錠5	リファタックテープ40mg
ニコランマート錠/5mg	

抗ウイルス薬(HIV治療薬)の商品名一覧

インビラーゼカプセル200mg	ノービア・ソフトカプセル100mg
インビラーゼ錠500mg	ノービア・リキッド
カレトラ錠	フォートベイスカプセル
カレトラ・ソフトカプセル	プリジスタ錠300mg
カレトラ・リキッド	レイアタツツカプセル150mg/200mg
クリキシバンカプセル/200mg	レクシヴァ錠700

抗真菌薬の商品名一覧

イコナゾンカプセル50	イトラリール錠50/100
イデノラートカプセル50mg	イトリゾールカプセル50
イトラートカプセル50	イトリゾール注1%
イトラコナゾール錠50/100「MEEK」	イトリゾール内用液1%
イトラコネート錠50mg/100mg	トラコナ錠50mg/100mg
イトラコンカプセル50	

抗不整脈薬の商品名一覧


アジマリン錠50「イセイ」	タイリンダーR錠
アジマリン錠「ヨウシン」	タイリンダーカプセル
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チヨバンカプセル50mg/100mg
アミオダロン塩酸塩錠100mg「サンド」	ノルペース50mg/100mg
アミサリン錠125mg/250mg	ノルペースCR錠
アミサリン注	ピメノールカプセル50mg/100mg
アンカロン錠100	ファンミルR錠
アンカロン注150	ファンミルカプセル
ジソピラR錠	リスピンR錠150mg
ジソピラミドカプセル100mg「タイヨー」	リスピンカプセル100mg
ジソピランカプセル	リスモダンR錠150mg
シノベジール錠50mg/100mg	リスモダンカプセル50mg/100mg
シベノール錠50mg/100mg	リスモダンP静注50mg
シベノール注射液	リスラミドR錠150mg
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg/100mg「サワイ」	リゾラミドR錠
シベンゾリンコハク酸塩錠50mg/100mg「タナベ」	リゾラミドカプセル
シンビット静注用50mg	硫酸キニジン錠
ソタコール錠40mg/80mg	硫酸キニジン錠100mg「メルク」
ソピラート「カプセル」/カプセル100mg	硫酸キニジン「ホエイ」

レビトラ[®]錠 は勃起 を助けるお薬です。




正常な勃起に，性的な興奮が脳から陰茎海綿体に伝わった結果，陰茎の血管が大きく拡がり，血液が流れ込んで勃起が起こります。

レビトラ[®]錠は，何らかの原因で拡がりにくくなった陰茎の血管を拡がりやすくし，血液の流れを改善して，勃起を助ける働きがあります。

- 
- A photograph of a man and a woman in a park. The man, in the foreground, is holding a water hose and spraying water towards the woman. The woman, in the background, is also holding a hose and spraying water. They are both smiling and appear to be enjoying the activity. The background shows trees and a path.
- 不安や緊張のため十分な効果が現れない場合があります。あきらめずに何回か服用してみてください。
 - 何回か服用しても効果が感じられない場合は、医師にご相談ください。レビトラ錠には 5mg, 10mg, 20mg の3用量があり、医師の判断で高用量を服用することも可能です。

レビトラ[®]錠の効果は速やかです。
速い方では10分, 多くの方は
30分で効果が現れることが
報告されています。*



- 
- レビトラ錠は性的な興奮を高める催淫剤ではありません。
レビトラ錠を服用しても性的刺激がなければ、勃起は起こりません。
 - 性的刺激が加わると、レビトラ錠は速やかに効果を発現し、
自然な勃起と変わらぬ効果を発揮します。
 - 性的興奮が治まると、自然に勃起も治まります。


レビトラ[®]錠服用の タイミングについて.



レビトラ[®]錠は標準的な食事*による影響を受けないという報告がありますが、薬の効果を実感していただくためには、空腹時での服用をお奨めします。

* 総エネルギーに占める脂肪の割合が約30%

〈参考〉日本人男性の平均脂質摂取量は総エネルギー量の24.5%です。(平成14年国民栄養調査より)





レビトラ[®]錠の
にせものに
ご注意ください。

WARNING

- レビトラ[®]錠は医師の処方により、初めて購入できる医薬品です。
- 最近、医薬品の個人輸入代行業者等を通じて販売されているものの中に、にせもののレビトラ[®]錠（LEVITRA[®]）が見つかっています。
- にせものの中には成分の特定できないものなど、健康に被害を及ぼす薬物が混入しているおそれがあります。
- インターネット等での安易な購入、ご使用はお控えいただけます様、お願い致します。

× 偽造品



レビトラ錠の100mgは
製品化されていません。



レビトラ錠の10錠包装は
製品化されていません。

○ 日本で承認されているレビトラ錠



日本で承認されている
レビトラ錠は5mg, 10mg,
20mg の3種類です。

○ 米国で承認されているレビトラ錠



アメリカでは薬局で販
売されていますが、日本
では病院・医院でのみ
処方されています。

レビトラ[®]錠を効果的にお使いいただくために

監修：高松赤十字病院 第二泌尿器科 部長 川西泰夫 先生

チェック ☒ してみましょう 

.....




☐ 性行為の約1時間前に薬を服用しましたか？

レビトラ[®]錠は効果が現れるまでに多少時間がかかります。服用から性交までの時間が短すぎたり長すぎたりすると、十分に効果が現れないことがあります。



☐ 性的刺激はありましたか？

レビトラ[®]錠には性欲を高める作用はなく、服用ただけでは勃起しません。性的な刺激を受けて初めて勃起が起こります。レビトラ[®]錠は勃起が起こるのを助ける薬です。



☐ お酒や食事を摂りすぎていませんか？

お酒を飲みすぎると勃起しにくくなります。また、レビトラ[®]錠は標準的な食事では影響を受けませんが、食事の内容によっては効きにくくなる可能性があります。飲みすぎ食べすぎには注意しましょう。



☐ Try again !

初めてレビトラ[®]錠を服用する場合、不安や緊張のため十分な効果が現れないことがあります。あきらめないで何回か服用してみてください。

医療従事者の皆様へのお願い

患者氏名：

年齢：

住所：

Tel：

Fax：

この患者様は、**レビトラ[®]**（バルデナフィル）を服用しています。
レビトラ[®]の服用後24時間以内は次の薬剤の使用は避けてください。

■**硝酸剤及び一酸化窒素（NO）供与剤**：ニトログリセリン、亜硝酸アミル、硝酸イソソルビド、ニコランジル等

■**チトクローム P450 3A4を強く阻害する薬剤**：リトナビル、インジナビル、アタザナビル、サキナビル、メシル酸サキナビル、ホスアンプレナビル、ロピナビル・リトナビル、ダルナビル、ケトコナゾール、イトラコナゾール等

■**クラスIA又はクラスⅢの抗不整脈薬**：キニジン、プロカインアミド、アミオダロン、ソタロール等

ハサミ等で切り取ってご使用ください

MEMO

●EDに関する情報は
EDネットクリニック(PC)
www.ed-netclinic.com

ED バイエル

検 索



目次

シアリス®錠を安全に使用していただくために。	A 4
心臓の病気で、硝酸剤の治療を受けている方は服用しないでください。	A 5
もし、シアリス®錠服用後に狭心症の発作が起きたら……。	A 6
次にあてはまる方はシアリス®錠を服用しないでください。	A 7
次にあてはまる方はシアリス®錠の服用に際して注意が必要です。必ず医師に相談してください。	A 8
必ず医師の指示を守って服用してください。	A 9
シアリス®錠は催淫剤や性欲増進剤ではありません。	A 10
シアリス®錠を服用した後に気を付けていただきたいこと。	A 11
ほかの診療科、医療機関を受診されるときは、シアリス®錠を服用していることを申し出てください。	A 12
シアリス®錠には性行為感染症を防ぐ効果はありません。	A 12
シアリス®錠をほかの人に譲らないでください。	A 13
性行為は心臓に負担をかけます。 無理をしないようにしましょう。	A 13
次の薬剤を使用されている方はシアリス®錠を服用しないでください。	A 14

シアリス[®]錠の 正しい使い方について

この冊子にはシアリス[®]錠に関する
大切な情報が記載されています。

シアリス[®]錠を正しく安全に使用していただくために、
服用前に必ず最後までよくお読みください。

また、いつでもご覧いただけるよう、
大切に保管してください。

監修：奥山 明彦 先生

大阪大学大学院医学系研究科
器官制御外科学（泌尿器科学）教授

シアリス®錠を安全に 使用していただくために。

以下の点について、医師に十分話されましたか？

- あなたの症状
- 過去および現在のほかの病気
- 服用中の薬

シアリス®錠は性的刺激があった時、自然な勃起を助ける薬です。

この冊子に記載された注意事項を十分ご理解の上、正しく使用してください。

質問や、わからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**心臓の病気で、
硝酸剤の治療を受けている方は
服用しないでください。**

狭心症などの心臓病によく用いられるニトログリセリンなどの硝酸剤*を使用している方はシアリス[®]錠を絶対に服用しないでください。

急激に血圧が下降し、重い副作用を起こすことがあります。

- 硝酸剤には飲み薬だけでなく、舌下錠、貼り薬、吸入薬、注射、塗り薬、スプレーなどもあります。
- あなたがお使いの薬に硝酸剤が含まれていないかどうか医師または薬剤師に相談してください。

*詳しい薬剤名はA14ページをご覧ください。

もし、シアリス[®]錠服用後に 狭心症の発作が起きたら……。

発作の治療を受ける際には、必ずシアリス[®]錠を「服用していること」「服用した時間」を医師にお伝えください。

- 一般に性行為は心臓に負担をかけますので、今まで狭心症と診断されたことがない方でも、性交中に狭心症の発作を起こす場合があります。
- 一般に狭心症の発作の治療には硝酸剤がよく使われますが、シアリス[®]錠を服用している場合は、急激に血圧が下降するおそれのあることから、硝酸剤が使用できず、ほかの薬を使用する場合があります。
- 発作時にご本人が医師に伝えられない場合もありますので、パートナー、ご家族にもあらかじめシアリス[®]錠を服用していることを伝え、救急医療機関を受診する際には、医師などに「シアリス[®]錠を服用している」ことが必ず伝わるようにしてください。

次にあてはまる方はシアリス®錠を服用しないでください。

- 硝酸剤*を使用中の方
- 今までにシアリス®錠を服用して過敏症(アレルギー)を起こしたことがある方
- 心血管系障害などにより医師から性行為を控えるように言われた方
- 不安定狭心症のある方、または性交中に狭心症を起こしたことがある方
- 最近3カ月以内に心筋梗塞を起こしたことがある方
- 最近6カ月以内に脳梗塞・脳出血を起こしたことがある方
- コントロール不良の不整脈のある方
- 低血圧の方
(最大血圧が90mmHg未満または最小血圧が50mmHg未満の方)
- コントロール不良の高血圧の方
(最大血圧が170mmHg以上または最小血圧が100mmHg以上の方)
- 重い肝障害のある方
- 網膜色素変性症(進行性の夜盲、視野狭窄)の方

*詳しい薬剤名はA14ページをご覧ください。

次にあてはまる方はシアリス[®]錠の服用に際して注意が必要です。必ず医師に相談してください。

- 肝臓の悪い方
- 腎臓の悪い方
- 陰茎の病気（屈曲、しこりなど）のある方
- 血液の病気（鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病）のある方
- 血が止まりにくいなど出血性の病気のある方、または消化性潰瘍のある方
- 他の勃起不全治療剤、勃起補助器具を使用している方、手術を受けたことのある方
- 高齢の方
- 心臓病、高血圧症、排尿障害などの治療薬を服用中の方*
- 過去に視力喪失の経験のある方

*シアリス[®]錠には併用してはいけない薬や併用に注意すべき薬があります。ほかの薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

必ず医師の指示を守って 服用してください。

シアリス[®]錠の服用は1日1回とし、次の服用は必ず24時間以上*あけてください。

*腎障害のある方は、次の服用を48時間以上あけるなどの注意が必要です。
必ず医師の指示を守って服用してください。

医師の指示なしに、自分の判断で量を増やさないでください。

- 特に肝臓の悪い方や腎臓の悪い方は、医師の指示を守って服用してください。
- 薬の効果には個人差があります。もし、指示された量で効果が得られない場合には、医師または薬剤師に相談してください。

シアリス[®]錠は催淫剤や 性欲増進剤ではありません。

シアリス[®]錠服用後も、性的刺激のない状態では勃起しません。
性的刺激を受けて初めて勃起し、性的刺激が中止されれば
(性行為が終了すれば) 勃起はおさまります。

なお、勃起が4時間以上続いている場合には、直ちに医師の
診察を受けてください。

シアリス®錠を服用した後に 気を付けていただきたいこと。

一般的に薬を服用すると、時に副作用が出る場合があります。
シアリス®錠を服用して次のことに気が付いたら、すぐに医師の
診察を受けてください。

●4時間以上勃起が続く。

(早急に治療しないとペニスが損傷し、勃起機能を失うことがあります。)

また、シアリス®錠によって、以下の副作用の報告があります。
その多くは軽度で一過性ですが、こうした症状のほかにも気にな
る症状がある場合には服用を中止し、医師または薬剤師に
相談してください。

●頭痛

●顔が赤くなる(ほてり)

●消化不良

**ほかの診療科、医療機関を
受診されるときは、
シアリス[®]錠を服用している
ことを申し出てください。**

ほかの病気やほかの薬に悪い影響を及ぼす場合があります

**シアリス[®]錠には性行為感染症を
防ぐ効果はありません。**

**シアリス[®]錠をほかの人に
譲らないでください。**

シアリス[®]錠の服用は、必ず医師の診断のもとに処方を受ける必要があります。

あなたに処方されたシアリス[®]錠を、絶対にほかの人に渡してはいけません。その人が性行為を行うことが好ましくない心臓の病気にかかっていたり、シアリス[®]錠と一緒に飲むと影響のある薬を使用されている場合もあり、大変危険です。

**性行為は心臓に負担をかけます。
無理をしないようにしましょう。**

次の薬剤を服用されている方は シアリス®錠を服用しないでください。

主なニトログリセリンなどの硝酸剤（飲み薬、舌下錠、貼り薬、吸入薬、塗り薬、スプレー）の商品名

アイスラール錠20mg	L-オーネスゲン錠
アイトロール錠10mg / 20mg	カリアントSRカプセル20mg
アイロクール錠20	コンスピット錠
亜硝酸アミル「三共」	サワドールL錠
アパティアテープ40mg	サワドールテープ40mg
アンタップR	ジアセラL錠20mg
イソコロナールRカプセル	シグマート錠2.5mg / 5mg
イソコロナールRカプセル20mg	シグランコート錠2.5mg / 5mg
イソニトール錠20mg	ジドレンテープ27mg
イソピットテープ40mg	硝酸イソソルビド錠（ツルハラ）
イソモニット錠20mg	硝酸イソソルビド除放錠20mg「タイヨー」

硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	ニプラノール点眼液0.25%「TOA」※
シルビノール錠5mg	ニプラノール点眼液0.25%「サワイ」※
ステンベルガー錠5mg	ニプラノール点眼液0.25%「ニッテン」※
ソプレロール錠20mg	ニプラノール点眼液0.25%「わかもと」※
タイシロール錠20mg	ハイパジールコーワ錠3/6
ニコランジス錠5mg	ハイパジールコーワ点眼液0.25%※
ニコランタ錠5	バソレーターテープ27mg
ニコランマート錠5mg	バソレーター軟膏
ニトラステープ40mg	フランドル錠20mg
ニトルビン錠5	フランドルテープ40mg
ニトロールRカプセル20mg	ミオコールスプレー0.3mg
ニトロール錠5mg	ミニトロテープ27mg
ニトロールスプレー1.25mg	ミリステープ5mg
ニトログリセリン舌下錠0.3mg「NK」	メディトランステープ27mg
ニトロダームTTS	リファタックL錠20mg
ニトロペン舌下錠0.3mg	リファタックテープ40mg
ニプラノール点眼液0.25%※	

※併用禁忌になっておりませんが、念のため記載しました。

(保険薬事典 平成21年4月版より改変)

目次

シアリス®錠は性的刺激があった時、
自然な勃起を助ける薬です。

B 3

シアリス®錠の勃起を助ける効果は、
36時間にわたり認められています。

B 5

ライフスタイルに合わせた服用が可能です。

B 7

いつでも食事のタイミングを気にせず服用できます。

B 9

勃起障害をきちんと治療するために、
薬の効果、気になることを医師にお伝えください。


B 11

シアリス®錠のにせものにご注意ください。

B 13

Cialis[®] Life

シアリス錠の使用ポイント



「シアリス[®]錠の正しい使い方について」(**A 10** ページ)をご参照ください。

シアリス[®]錠は 性的刺激があった時、 自然な勃起を助ける薬です。

性的な刺激があると、陰茎に血液を送る血管が広がって、
たくさんの血液が海綿体の中に流れ込み、勃起が起こります。

血管が十分広がらないと、十分な勃起が起こらない、
あるいは勃起を維持できなくなり、性交時に支障が生じます。

シアリス[®]錠は性的な刺激に応じて陰茎の血管を
広がりやすくして勃起を助ける働きがあります。

性的刺激に自然に反応して勃起し、それを維持する、
その手助けをする薬、それがシアリス[®]錠です。

シアリス[®]錠が勃起を助けるのは、性的刺激が加わった時です。

また、シアリス[®]錠は性的な興奮を高める薬ではありません。

シアリス[®]錠の勃起を助ける効果は、 36時間にわたり認められています。


- シアリス[®]錠は、服用後36時間まで効果が認められています。
- この間、性的な刺激があった時だけ勃起が起こります。

つまり、シアリス[®]錠の効果は36時間続くといっても、
ずっと勃起が続いているということではありません。

Carson CC:BJU International 93:1276, 2004

ライフスタイルに合わせた服用が可能です。

- 服用約1時間後から36時間後までシアリス®錠の効果は認められていますので、性行為の直前に服用いただく必要はありません。
- 例えば、朝服用した場合は、次の日の夜まで、また夕方服用した場合は二日後の朝までその効果は継続します。



「シアリス®錠の正しい使い方について」(A 9 ページ)をご参照ください。

Carson CC:BJU International 93:1276, 2004

いつでも 食事のタイミングを気にせず 服用できます。

シアリス[®]錠は食事による影響を受けませんので、
空腹時、食前、食後のいつでもタイミングを気にすることなく
服用できます。

シアリス[®]錠の場合、夕方に服用し、
夕食もゆっくり楽しんでいただくこともできます。



日本イーライリリー株式会社 社内資料：食事の影響
Carson CC:BJU International 93:1276, 2004

勃起障害をきちんと治療するために、 薬の効果、気になることを 医師にお伝えください。

シアリス®錠を飲んだ場合の効果、
あるいは好ましくない作用がありましたら、
それらについて必ず医師にお伝えください。
医師は増量または減量によって、
あなたに合った薬の量を調節します。
シアリス®錠は医師により処方される医薬品ですので、
医師の管理の下、正しく使うことが大切です。

「シアリス®錠の正しい使い方について」([A 11](#) ページ) をご参照ください。

シアリス®錠のにせものにご注意ください。

シアリス®錠は医師の処方が必要な医薬品です。医師の管理の下に、ご使用ください。

最近、医薬品個人輸入代行業者等を通じて販売されているもののなかに、

シアリス®錠（英語表記 Cialis®）のにせものが見つっています。

にせものの中には、異なる成分などが混入しているおそれがあり、


予測できない健康被害が懸念されます。

インターネット等での個人輸入による安易な使用はお控えください。



違法なにせもの製造設備

世界保健機関 (WHO) . www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/ [last accessed: September 2005]





日本新薬株式会社

学術部 医薬情報課 くすり相談担当

ED治療相談専用ダイヤル

一般の方・
患者様向け

いっぱい知ろうよ

0120-184604※1

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30※2

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからでもご利用いただけます。

※2 祝祭日及び当社休日を除きます。

シアリス®およびCialis®は、米国イーライリリー・アンド・カンパニーの登録商標です。