




図 2 KOH 標本 (×1,000)

カンジダの偽菌糸が明瞭に観察できる。これは検体採取から約 1 分後の標本である。




図 1-3 カンジダ症

表 2 抗真菌剤ならびに抗トリコモナス剤

抗真菌剤

剤 型	一 般 名	商 品 名	1錠(本)中 含有量	使 用 法
腔 錠 (坐薬)	トリコマイシン	トリコマイシン腔錠	5 万 U	1錠/日 10~14日間
	ピマリシン	ピマフシン腔錠	25 mg	〃
	クロトリマゾール	エンペシド腔錠	100 mg	1錠/日 6日間
	ミコナゾール	フロリード腔坐剤	100 mg	〃
	硝酸エコナゾール	パラベール腔坐剤	50 mg	〃
	硝酸イソコナゾール	アデスタン G ¹⁰⁰ 腔錠 300	100 mg	1錠/日 6日間
			300 mg	2錠1回使用
	硝酸オキシコナゾール	オキナゾール ¹⁰⁰ 腔錠 600	100 mg	1錠/日 6日間
			600 mg	1錠1回使用
外 用 塗 布 剤	ナイスタチン	マイコスタチン軟膏	10 万 U (1 g)	1日数回塗布
	ピマリシン	ピマフシン軟膏	20 mg (1 g)	〃
	クロトリマゾール	エンペシドクリーム	10 mg (1 g)	〃
	ミコナゾール	フロリード D クリーム	〃	〃
	硝酸エコナゾール	パラベールクリーム	〃	〃
	硝酸イソコナゾール	アデスタンクリーム	〃	〃
	硝酸オキシコナゾール	オキナゾールクリーム	〃	〃

抗トリコモナス剤

剤 型	抗トリコモナス剤	商 品 名	1錠中含有量	使 用 法
膣 錠	メトロニダゾール	フラジール	250 mg	1錠/日 10～14日間
	チニダゾール	ファシジン	200 mg	〃
	トリコマイシン	トリコマイシン	5万 U	〃
経 口 剤	メトロニダゾール	フラジール	250 mg	1日 500 mg 分2 10日間 1,500 mg 1回投与
	チニダゾール	ファシジン	200 mg	1日 400 mg 分2 10日間
			500 mg	2,000 mg 1回投与

抗真菌剤は構造式の
違いによって系統
分類される

外用抗真菌薬

チオカルバミン酸系

ゼフナート（鳥居）

ハイアラージン（アステラス）

セパリン（住友）

アゾール系

イミダゾール系

- **アトラント（鳥居、久光、三菱ウエルファーマ）**
- ニゾラル（ヤンセンファーマ）
- アスタット（ツムラ）
- マイコスポール（バイエル）
- エンベシド（バイエル）
- フロリードD（持田）
- アデスタン（インテンディス）
- オキナゾール（三菱ウエルファーマ）
- エクセルダーム（田辺）
- ビルツシン（塩野義）
- パラベール（大塚）

モルフォリン系

→ ベキロン（ガルデルマ）

アリルアミン系 ベンジルアミン系

ベンジルアミン系

メントックス（科研）

ボレー（久光）

アリルアミン系

→ ラミシール（バルティス）